

روش صحیح شیردهی

روش صحیح تغذیه باشیر مادر

۱- پس از تولد بلا فاصله نوزاد را روی سینه مادر در تماس پوست با پوست قرار میدهند و ظرف یک ساعت اول تولد شیردهی را شروع کنید شیر روزهای اول آگوز نام دارد که حاوی مواد بسیار معدی و اینمی بخش بود و به عنوان اولین واکسن نوزاد برای پیشگیری از ابتلا به انواع بیماری ها تلقی می شود.

۲- شیر مادر حاوی تمام مواد معدی مورد نیاز شیرخوار است که کودک را در شش ماه اول تولد به طور انحصاری (فقط) با شیر مادر تغذیه کنید و به هیچ وجه نباید آب، آب قند و شیر مصنوعی به شیرخوار داد.

۳- مهمترین عامل در افزایش شیرمادر مکیدن مکرر و تخلیه مرتب پستان ها بر حسب میل و تقاضای شیرخوار است.

۴- از به کار بردن پستانک و تیشه شیر که سبب کاهش شیرمادرانقلال آلوگی عفونت، بیماری، تغییر فرم دندان ها و فک شیرخوار میشود جدا پرهیز کنید.

۵- نباید محدودیتی در شیر دادن به نوزاد وجود داشته باشد و تغذیه براساس میل و تقاضای شیر خوار داده می شود.

۶- در طول شب سیستم هورمونی مادر فعال تر و تولید شیر در شب بیشتر است و معمولاً نوزاد چند نوبت برای شیرخوردن در شب بیدار می شود.

**** مادران عزیز لطفاً شیردهی در شب را انجام دهیدتا به تولید شیر بیشتر شما کمک کنند ***



پارستان شهرستان سر

۷- پر خوردن طولانی (بیش از ۴۰ دقیقه در هر نوبت) و خیلی کوتاه مدت (کمتر از ۱ دقیقه هر نوبت) ممکن است حاکی از خوب نگرفتن پستان توسط شیرخوار باشد.

۸- درد یا زخم نوک پستان مادر مربوط به نحوی غلط شیردهی و خوب نگرفتن پستان توسط شیرخوار است.

* بهترین درمان برای زخم نوک سینه این است که پس از شیردهی از شیرمادر به نوک سینه بمالید و در کنار آن سعی کنید نوک سینه را خشک نگهدازید.

۹- شیر مادر با گذشت زمان متناسب با نیاز رشدی شیرخوار تغییر میکند بنابراین شیره رمادی برای فرزند خودش بهترین است. چربی شیرمادر در شروع هر بار شیردهی کمتر است پس میزان آن بتدريج بيشتر میشود اين تغييرات موجب سير نگهداشت نوزاد و وزن گيری او می شود.

۱۰- به علت وجود آب کافی در ابتدای شیر تشنجی شیرخوار برطرف و اشتهاي او تحريك می شود و نيازی به دادن آب در ۶ ماه اول حتی در مناطق گرم و خشک نیست.

علایم اولیه گرسنگی و تغذیه صحیح

۱- افزایش حرکات چشم
۲- بیدار شدن - نگاه کردن به این طرف و ان طرف - حرکات دهان، اندام و بیقراری - مکیدن انگشtan و اجازه داد نشود شیر خواره خاطر گرسنگی گریه کند. با ورود شیر به دهان مکیدن ها آرام عمیق و گاهی مکث می کند صدای قورت دادن به خوبی شنیده می شود گونه گرد و برا مده است نه فرورفته و هنگام سیری صدای بلع کم شده و یا متوقف می شود - مکیدن ها تغییر می کند و به خواب می رود و خودش

اروغ گرفتن شیرخوار

بعضی از شیرخواران در حین تغذیه پستانی مقدار کمی هوا را می-بلعند و بهتر است بعد از اتمام تغذیه برای خروج هوا از معده شیرخوار(اروغ گرفتن) به یکی از اشکال زیر اقدام نمود و به آرامی پشت نوزاد را ماساژ یا نوازش کرد.



www.palyamakelamit.com

مادر گرامی

لطفا در صورت داشتن مشکل در شیردهی به ادرس (بیمارستان تنفسن) (قسمت پایگاه بهداشتی) مراجعه کنید



نحوه‌ی صحیح گرفتن پستان

- * مادر باید پستان را بالب شیرخوار تماس دهد و صبر کند تا شیر خوار دهانش را کاملاً باز کند.
- * چانه شیر خوار در تماس با پستان مادر باشد.
- * لب پایین او به طرف خارج برگشته باشد.
- * اگر پستان خیلی پر است به نحوی که سیرخوار نتواند به درستی پستان را بگیرد قبل از شیردادن شیر را بدوشد تا هاله پستان نرم شود و شیرخوار پستان را بگیرد.

پستان را رها میکند و نوک پستان در این حالت کشیده تر و بلند تر از حد معمول است.

- ۳- درابتدا باید شیرخوار در هر وعده از هردو پستان بر حسب میلش تغذیه شود تا تولید شیر برقرار شود و باید به طبق اجازه داده شود که خودش سینه را رها کند تا شیر انتهایی را دریافت کند که چربتر است و باعث وزن گیری بهتر می-شود. در وعده بعد، شیردهی از پستانی شروع شود که شیر خوار در وعده قبل شیر کمتر از آن خورده یا اصلاً نخورده است تا تولید شیر در هر دو پستان برقرار شود.

علایم کفایت شیر مادر

- ۱- وزن گرفتن شیر خوار در ۶ ماه اول زندگی یک شیر خوار افزایش وزنی حدود ۱۰۰-۲۰۰ گرم در هفته دارد.
- ۲- دفع ادرار (مخصوصاً ادرار کمرنگ نشانه دریافت کافی شیر مادر است)
- ۳- اجبات مراج
- ۴- وضع عمومی شیر خوار (هوشیار است و قدرت عضلانی مناسب و پوست شاداب دارد)

نحوه‌ی صحیح در آگوش گرفتن شیرخوار

- ۱- شانه و گردن راحت و آزاد باشد.
- ۲- مادر کاملاً آسوده و بدون هیچ گونه قشار و اضطرابی باشد.
- ۳- مادر باید تمامی بدن کودک را در آگوش گرفته و در تماس نزدیک با خود قرار دهد.
- ۴- معمولاً سر نوزاد در چین آرنج و گفت دست مادر زیر یا سن نوزاد قرار میگیرد و بدن و سر کودک در امتداد هم میباشد.