

راهنمای آموزش بیماران

اسهال و استفراغ



دانشکاده علم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
کلینیک ویژه تخصصی سندج



- تشدید تهوع، استفراغ که قادر به خوردن و آشامیدن نباشد.
- عدم بهبود اسهال بیش از ۱۰ روز.
- کاهش حجم ادرار یا تیره شدن رنگ ادرار.
- کاهش شدید وزن بدن.
- ضعف و بی حالی شدید.
- کاهش سطح هوشیاری.
- درد یا سفتی حرکات گردن.
- تنگی نفس یا درد قفسه سینه.



راهنمای ترخیص بیماران اسهال و استفراغ

۱ هدف اصلی درمان بیماری شما کنترل علایم رفع کم آبی بدن است و معمولاً خود به خود بهبود می یابد.

۲ علایم اسهال استفراغ عفونی شامل استفراغ، اسهال طول کشیده، تب خفیف، بی اشتهايی، دل پيچه، احساس خستگی، ضعف و درد عضلاتی است که ممکن است بین ۱۰ - ۳ روز طول بکشد.

۳ از مصرف خودسرانه داروهای ضد اسهال و انواع آنتی بیوتیک خودداری فرمایید.



۴ در صورت تجویز آنتی بیوتیک توسط پزشک برای اسهال عفونی شما، دورهٔ ی درمان را تکمیل کنید.

۵ به هیچ وجه از آسپیرین، بروفن و ناپروکسن استفاده نکنید چون باعث تشدید درد معده می شود.

۶ جهت پیشگیری از کم آبی بدن ORS (هر بسته پودر در ۴ لیوان آب سرد) مصرف کنید.

۷ از مصرف شیر، چای سنگین و نوشیدنی های حاوی کافئین مثل قهوه و نسکافه خودداری کنید.

۸ از آب میوه های طبیعی و رقیق و یا نوشیدنی های حاوی نعناع استفاده کنید.

۹ بعد از بهبودی نسبی، جهت شروع رژیم می توانید از برنج یا غلات پخته شده سیب، موز، نان، گوشت و سبزیجات پخته شده، سیب زمینی و ماست شیرین کم چرب در حجم کم و نوبت های زیاد مصرف کنید.

۱۰ تازمانی که کلیه علایم از تهیه و طبخ غذا برای دیگران خودداری کنید چون گاسترو آنتریت (اسهال، استفراغ عفونی) واگیردار است

۱۱ دستان خود را به طور مرتب با آب و صابون بشویید.

۱۲ در صورت بروز هریک از علایم زیر به اورژانس مراجعه کنید:

- تشدید درد شکم

- بروز درد ثابت و مداوم در یک نقطه‌ی خاص شکم

- عدم پاسخ به مصرف داروها

- دفع خون همراه مدفوع با هدفouج قبری رنگ

- وجود خون روشن یا تیره در محتويات استفراغ

- تب بیشتر از ۳۸,۵ درجه

