

تشنج ناشی از تب



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
کلینیک ویژه تخصصی سنتنج



۵) اگر کودک شما سابقه تب و تشنج دارد بانظر پزشکی در زمان تب شدید علاوه بر استامینوفن و پا شویه کردن از داروی ضد تشنج به مقداری که پزشک دستور داده استفاده کنید تا از تشنج کودک پیشگیری شود.

۶) اگر بعد از تشنج کودک، پزشک دستور داد تا کودک شما به مدت طولانی (حدود ۲ سال) از داروهای ضد تشنج استفاده کند. حتماً این داروها را طبق دستور در زمان مناسب مصرف کنید و از کم کردن یا قطع کردن خودسرانه داروها پرهیزید.

پیش آگهی

اکثریت این کودکان بعد از سن ۵ سالگی دچار تشنج نمی شوند و به ندرت تشنج ناشی از تب بیشتر از یک بار اتفاق می افتد. تشنج ناشی از تب خوش خیم است و عارضه ای بر جا نمی گذارد مگر آن که طول بکشد، تکرار شود یا در معاینه عصبی کودک، پزشک نکته غیر طبیعی را مشاهده کند.

(استامینوفن) و پا شویه با آب و لرم تب کودک را کاهش دهید.

- برای پا شویه کودک از آب سرد استفاده نکنید. زیرا استفاده از آب سرد می تواند شوک ایجاد کند.

۳) هیچگاه برای کاهش تب کودک از آسپیرین یا آمپول های تب براستفاده نکنید.

۴) کودک را برای بررسی علت تب نزد پزشک ببرید.

در صورتی که پزشک احتمال منزئتی را در کودکی بدید کشیدن مایع نخاع کودک جهت آزمایش و تشخیص بیماری ضروری است. در این زمینه با پزشک همکاری کنید.



۵) ممکن است کودک برای چند لحظه به نقطه‌ای خیره شده و در این مدت متوجه اطراف نباشد.

پیش خبر حمله قریب الوقوع تشنجه در کودک دارای تب شامل لرزش، خیرگی به یک نقطه، توهمندی، تحریک پذیری و داد و فریاد است.

درمان

اغلب حملات ناشی از تب تارسیدن به یک مرکز درمانی قطع می‌شود. با این وجود در صورتی که تشنجه ادامه داشته باشد درمان دارویی و اقداماتی برای کاستن درجه حرارت انجام می‌شود.

نکات قابل توجه در مورد کودکانی که در زمان تب دچار تشنجه می‌شوند:

(۱) اگر کودک شما به علت سرماخوردگی یا هر عفونت دیگری دچار تب شدید شد حتیماً با استفاده داروی ضد تب

بیشتر موقع تشنجه همراه با تب، در اثر عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی یا عفونت حاد گوش میانی و یا التهاب لوزه سوم ایجاد می‌شود. گاهی ممکن است علت بروز تشنجه ناشی از تب منزه باشد. در این حالت دیگر تشنجه ناشی از تب نامیده نمی‌شود.

سن شایع بروز تشنجه ناشی از تب بین ۶ ماه تا ۵ سال است. پسران بیش از دختران دچار تشنجه می‌شوند. نسبت شیوع حملات ناشی از تب در کودکان خردسال ۲ الی ۵ درصد است. در بسیاری از موارد سابقه خانوادگی از نظر تشنجهات ناشی از تب مثبت است.

علت حملات ناشی از تب همچنان ناشناخته است. در اغلب کودکان درجه تب می‌تواند یک عامل ایجاد کننده باشد، درجه حرارت معمولاً $38/8$ درجه سانتیگراد است و حملات معمولاً در طی بالا رفتن درجه حرارت رخ می‌دهد.

عادیم

(۱) کودک دچار اختلال هوشیاری می‌شود یعنی اطرافیان را نمی‌شناسد، متوجه زمان و مکان نمی‌شود، به صدازدن شما پاسخ نمی‌دهد با بیهوش بروی زمین می‌افتد

(۲) حرکات غیر ارادی در دستگاهی یا تمام اعضای بدن ایجاد می‌شود. این حالت چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشد. معمولاً کمتر از ۱ دقیقه می‌باشد.

(۳) ممکن است کودک در زمان حمله کنترل ادرار خود را از دست بدهد.

(۴) گاهی کودک به صورت ناگهانی رفتار غیر ارادی نشان می‌دهد مثلاً بدون متوجه اطراف باشد شروع به دویدن می‌کند.

تشنج

تشنج نتیجه عملکرد نامناسب سیستم الکتریکی مغزی باشد. که دارای دو خصوصیت است:

- به صورت ناگهانی آغاز می‌شود.

- غیر ارادی و غیر قابل کنترل است. نشانه‌های آن ممکن است شامل عدم آگاهی یا تغییر در آگاهی، حرکات غیر ارادی و تغییر در درک، رفتارها، احساسات و وضعیت قرارگیری فرد باشد. تشنجه شایع ترین اختلال عصبی درمان پذیر در کودکان است و در اثر بسیاری از بیماری‌های درگیر کننده سیستم عصبی رخ می‌دهد.

تشنج ناشی از تب

مطابق تعریف بروز حملات تشنجه حین تب، تشنجه ناشی از تب نامیده می‌شود.

زیرا در سنین ۶ ماه تا ۵ سالگی مغز کودکان به افزایش درجه حرارت حساس است در نتیجه بعضی از کودکان در این سنین با تب‌های شدید (بیش از 38 درجه) دچار تشنجه می‌شوند.

